

**ALLEGATO B****CALENDARIO DELLE VACCINAZIONI PEDIATRICHE****Offerta attiva e gratuita**

Vaccino	Nascita	3° mese	5° mese	11° mese	13° mese	15° mese	5-6 anni	11 anni	12-16 anni
DTP		DTaP	DTaP	DTaP			DtaP IPV		dTap
IPV		IPV	IPV	IPV					
HBV	HBV *	HBV	HBV	HBV					
Hib		Hib	Hib	Hib					
MPR					MPR 1		MPR 2	Var	

**Offerta attiva e gratuita per gruppi a rischio****Disponibilità a prezzo di costo**

Vaccino	3° mese	5° mese	11° mese	13° mese	15° mese	24° mese	36° mese	5-6 anni	11 anni	12-14 anni
PNC 7v										
MNC C										
Var							Var			

**DTaP**

vaccino anti-difterico-tetanico-pertossico acellulare pediatrico

**IPV**

vaccino anti-polio inattivato

**HBV**

vaccino anti-epatite B

**Hib**vaccino anti-*Haemophilus influenzae* b**MPR**vaccino anti-morbillo-parotite-rosolia – MPR 1: 1<sup>a</sup> dose – MPR 2: 2<sup>a</sup> dose**dTap**

vaccino anti-difterico-tetanico-pertossico acellulare formulazione adulti

**PNC 7v**

vaccino anti-pneumococcico coniugato eptavalente. E' possibile la co-somministrazione con vaccino esavalente

**MNC C**

vaccino anti-meningococcico C coniugato. E' possibile la co-somministrazione con vaccino esavalente. Una sola dose dopo i 12 mesi di vita che può essere co-somministrata con MPR

**Var**

vaccino anti-varicella

**HBV \***

nei nati da madre HbsAg positiva si somministrano contemporaneamente, entro 12-24 ore dalla nascita ed in siti separati, la prima dose di vaccino HBV e una dose di immunoglobuline specifiche anti-epatite B. Il ciclo va completato da una seconda dose a 4 settimane dalla prima, da una terza dose dopo il compimento dell'ottava settimana (può coincidere con la prima somministrazione del ciclo normale) e da una quarta dose all'11° mese (può coincidere con la 3° dose del ciclo normale)

**3° mese**

terzo mese di vita: periodo che intercorre dal compimento del 61° giorno di vita fino al 90° giorno di vita, dal compimento della 8<sup>a</sup> settimana di vita fino alla 12<sup>a</sup> settimana di vita

**MPR**

può essere somministrato contemporaneamente alla 3° dose del ciclo di base a 12 mesi compiuti